

Vắc-xin COVID-19 & Sự An Toàn Của Quý Vị: Những Điều Cần Biết

FDA Đã phê duyet



Đúng vậy, vắc-xin an toàn.

Hệ thống an toàn vắc-xin Hoa Kỳ đảm bảo rằng tất cả các loại vắc-xin đều an toàn nhất có thể. Tất cả các loại vắc-xin COVID-19 đang được sử dụng đều đã trải qua các kiểm tra về an toàn như nhau và đáp ứng cùng các tiêu chuẩn như bất kỳ loại vắc-xin nào khác được sản xuất trong những năm qua. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ các thử nghiệm lâm sàng lớn (gồm hàng chục ngàn người mỗi lần) FDA đã cho rằng các loại vắc-xin này là an toàn và hiệu quả với người lớn.



Những phản ứng dị ứng với vắc-xin không nhiều.

Các phản ứng dị ứng, bao gồm khó thở và nổi mề đay, đều không nhiều trong các thử nghiệm vắc-xin COVID-19. Khi tiêm vắc-xin này, quý vị sẽ được theo dõi các phản ứng trong ít nhất 15 phút. Nếu có tiền sử dị ứng với vắc-xin, quý vị nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi tiêm vắc-xin.



Không, những loại vắc-xin này không thể làm quý vị mắc COVID-19.

Không có loại vắc-xin COVID-19 nào đang được phát triển ở Hoa Kỳ sử dụng vi-rút sống gây ra COVID-19. Vắc-xin hướng dẫn các hệ thống miễn dịch của quý vị cách nhận biết và chống lại vi-rút gây ra COVID-19. Các nghiên cứu cho thấy tất cả các loại vắc-xin COVID-19 có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa các trường hợp nhập viện và tử vong do bệnh. Ngay cả khi quý vị vẫn bị nhiễm bệnh sau khi đã tiêm vắc-xin, các chuyên gia tin rằng vắc-xin có thể ngăn ngừa triệu chứng nặng.



Nếu quý vị đang mang thai hoặc đang cho con bú, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tiêm vắc-xin.

Trường Cao đẳng về Sản phụ khoa Hoa Kỳ và CDC cho rằng đối với phụ nữ mang thai, nguy cơ không tiêm vắc-xin cao hơn bất kỳ nguy cơ nào từ vắc-xin. Các chuyên gia y tế vẫn đang tiến hành các nghiên cứu về cách các vắc-xin ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai, nhưng cho đến nay chưa có vấn đề đáng kể nào được báo cáo. Memorial Hermann cung cấp vắc-xin cho phụ nữ mang thai. Một số nghiên cứu cho thấy trẻ bú sữa từ mẹ đã được tiêm vắc-xin cũng có kháng thể bảo vệ.



Các tác dụng phụ đã được chứng minh là tối thiểu.

Sau khi tiêm vắc-xin, một số người cảm thấy mệt mỏi hoặc bị đau cơ, sốt nhẹ, đau đầu hoặc sưng các hạch bạch huyết. Tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19 có thể giống như bệnh cúm và thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động hàng ngày của quý vị. Đây là những dấu hiệu bình thường, nghĩa là vắc-xin đang hoạt động để giúp hướng dẫn cho cơ thể quý vị cách chống lại COVID-19 khi tiếp xúc. Các tác dụng phụ thường gặp nhất sau liều thứ hai. Hầu hết các tác dụng phụ này sẽ biến mất sau vài ngày. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi bác sĩ hoặc y tá của quý vị.



Chưa có vắc-xin COVID-19 dành cho trẻ em.

Vì mục tiêu phát triển một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả nhanh nhất có thể, các nhà khoa học đã giảm phạm vi tập trung nghiên cứu. Hiện tại, vắc-xin Pfizer/BioNTech đã được phê duyệt cho người từ 16 tuổi trở lên, và vắc-xin Janssen của Moderna và Johnson & Johnson cũng đã được phê duyệt cho người từ 18 tuổi trở lên. Các nghiên cứu vắc-xin cho cả trẻ em sẽ sớm bắt đầu.

Để tìm hiểu thêm về vắc-xin COVID-19, hãy truy cập
www.memorialhermann.org/coronavirus hoặc www.CDC.gov.

NGUỒN: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html>

MEMORIAL
HERMANN